

## PARACETAMOL SUSPENSE 24MG/1ML 100ML

Složení: Paracetamolum 2,4 SyrSpend® SF PH4 liquid ad 100,0 ml

DÁVKOVÁNÍ:

<u>Hmotnost dítěte:</u>	<u>Věk dítěte:</u>	<u>Dávka (ml):</u>
5 – 6 kg	3 – 6 měsíců	<b>3 ml</b> (72 mg paracetamolu)
7 – 8 kg		<b>4 ml</b> (96 mg paracetamolu)
9 – 10 kg	6 – 12 měsíců	<b>5 ml</b> (120 mg paracetamolu)
11 – 13 kg	1 – 2 roky	<b>6 ml</b> (144 mg paracetamolu)
14 – 16 kg	2 – 3 roky	<b>8 ml</b> (192 mg paracetamolu)
17 – 20 kg	3 – 6 let	<b>10 ml</b> (240 mg paracetamolu)
21 – 25 kg	6 – 9 let	<b>13 ml</b> (312 mg paracetamolu)
26 – 33 kg	9 -12 let	<b>16 ml</b> (384 mg paracetamolu)
34 - 40 kg		<b>20 ml</b> (480 mg paracetamolu)

Správná dávka se určí pomocí uvedené tabulky podle tělesné hmotnosti dítěte. Pokud není jistota o tělesné hmotnosti dítěte, použije se k určení dávky přípravku věk dítěte.

### **Děti ve věku 2 – 3 měsíce:**

Dětem ve věku 2 - 3 měsíce se Panadol pro děti jahoda podává pouze po očkování k symptomatické úlevě od horečky.

Jednotlivá dávka je **2,5 ml** (120 mg/5 ml). Odstup mezi dávkami je 6 hodin. Pokud horečka přetrvává i po druhé dávce, je potřeba vyhledat lékaře.

Celková denní dávka nesmí přesáhnout 60 mg/kg tělesné hmotnosti.

Přípravek může být podáván opakovaně podle potřeby s odstupem jednotlivých dávek **nejlépe 6 hodin**.

Minimální interval mezi dvěma dávkami jsou 4 hodiny. Nepodávají se více než 4 dávky během 24 hodin.

Přípravek se dítěti nemá podávat déle než 3 dny bez porady s lékařem. Pokud nedejde k dostatečné úlevě od bolesti, je rodiče třeba poučit, aby se poradili s lékařem.